

Disciplina:	QUÍMICA	Nº Questões:	59
Duração:	120 minutos	Alternativas por questão:	5
Ano:	2017		

INSTRUÇÕES

1. Preencha as suas respostas na FOLHA DE RESPOSTAS que lhe foi fornecida no início desta prova. Não será aceite qualquer outra folha adicional, incluindo este enunciado.
2. Na FOLHA DE RESPOSTAS, assinale a letra que corresponde à alternativa escolhida pintando completamente o interior do rectângulo por cima da letra. Por exemplo, pinte assim se a resposta escolhida for A
3. A máquina de leitura óptica anula todas as questões com mais de uma resposta e/ou com borrões. Para evitar isto, preencha primeiro à lápis HB, e só depois, quando tiver certeza das respostas, à esferográfica.

1.	Dados os sistemas formados por: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">I. Vapor de água, dióxido de carbono e oxigénio.</td><td style="width: 33%;">II. Água, areia e gelo.</td></tr> <tr> <td>III. Água e óleo.</td><td>IV. Água oxigenada.</td><td>V. Água mineral</td></tr> </table> Assinale a opção com a resposta correcta:					I. Vapor de água, dióxido de carbono e oxigénio.	II. Água, areia e gelo.	III. Água e óleo.	IV. Água oxigenada.	V. Água mineral
I. Vapor de água, dióxido de carbono e oxigénio.	II. Água, areia e gelo.									
III. Água e óleo.	IV. Água oxigenada.	V. Água mineral								
	A. O sistema IV é mistura homogénea formada por duas substâncias C. O sistema I é mistura homogénea formada por três substâncias E. O sistema II é mistura bifásica formada por três substâncias B. Os sistemas III e V são soluções aquosas D. O sistema I é mistura trifásica formada por três substâncias									
2.	Quando aquecidos, os cristais cinza-escuros de iodo podem passar directamente para o estado gasoso sem deixar resíduos; vapores estes que podem passar novamente para o estado sólido, se a temperatura baixar novamente. Este trecho relata: A. Dois fenómenos físicos, a ebulição e a solidificação do iodo C. Decomposição da molécula de iodo por acção da temperatura E. Fenómeno químico da transformação do iodo sólido em gasoso e vice-versa B. Reacção do iodo com o calor D. Fenómenos físicos da sublimação do iodo									
3.	Quantos moles encontram-se em 900 gramas de carbonato de cálcio? Massas atómicas: Ca – 40, C – 12, O – 16 A. 1 B. 2 C. 6 D. 9 E. 5									
4.	Um dos compostos prejudiciais no cigarro é a nicotina ($C_{10}H_{14}N_2$). Um cigarro contém 1,62 mg de nicotina. Calcule o número de moles e o número de moléculas de nicotina que uma pessoa pode aspirar, fumando dois cigarros. Massas atómicas: C – 12, H – 1, N – 14 A. 1,62 moles e $6,02 \cdot 10^{21}$ moléculas C. 0,02 moles e $1,2 \cdot 10^{22}$ moléculas E. 0,1 mol e $6,0 \cdot 10^{23}$ moléculas B. 0,00002 moles e $1,2 \cdot 10^{19}$ moléculas D. 0,2 moles e $1,2 \cdot 10^{23}$ moléculas									
5.	A combustão completa do metano produz dióxido de carbono e água. A alternativa que representa o número de moles de dióxido de carbono produzido na combustão de 0,3 moles de metano é: A. 1,2 mol B. 0,6 mol C. 0,9 mol D. 0,3 mol E. 1,5 mol									
6.	A distribuição electrónica dos átomos de alguns elementos é a seguir representada: I. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ III. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$ II. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ IV. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$ Os elementos citados são respectivamente: A. ametal, gás nobre, ametal e metal B. ametal, metal, gás nobre e metal C. gás nobre, metal, metal e ametal D. ametal, gás nobre, metal e metal E. metal, ametal, metal e gás nobre									
7.	Assinale a alternativa que corresponde à regra de Hund: A. Orbital é a região do espaço, de maior probabilidade, onde se pode encontrar um electrão. B. Os subníveis s, p, d, f comportam, respectivamente, até 2, 6, 10, 14 electrões. C. O orbital s tem forma esférica. D. Os electrões de um orbital devem ter spins contrários. E. Todos os orbitais de um subnível são preenchidos parcialmente, para depois serem completos.									
8.	Um electrão sai de um Nível A para outro Nível B próximo do núcleo: A. Muda o sinal do spin de electrão. B. O electrão absorve ($A + B$) quanta de energia. C. O electrão liberta uma onda electromagnética equivalente à energia de $(A + B)$ quanta de energia. D. O electrão absorve ($A - B$) quanta de energia. E. O electrão liberta uma onda electromagnética equivalente à energia de $(A - B)$ quanta de energia.									
9.	Sendo dados os números atómicos de três elementos qual é a opção que apresenta elementos com propriedades semelhantes. A. 21, 25, 30 B. 1, 2, 6 C. 6, 7, 8 D. 9, 17, 35 E. 12, 13, 14									
10.	As propriedades a seguir indicadas variam de seguinte modo na tabela periódica: A. A eletronegatividade aumenta ao longo do período B. O raio atómico diminui ao longo do grupo									

	C. A energia de ionização diminui ao longo do período E. A eletropositividade diminui ao longo do grupo		D. A afinidade eletrónica aumenta ao longo do grupo																					
11.	Os elementos químicos que pertencem ao grupo dos halogéneos possuem a seguinte configuração electrónica na sua camada de valência: A. np^5 B. $ns^2 np^4$ C. $ns^2 nd^3$ D. $nd^5 ns^2$ E. $ns^2 np^5$																							
12.	O ião $^{24}_{12}Mg^{2+}$ possui: A. 12 protões, 12 electrões e 12 neutrões B. 12 protões, 12 electrões e carga zero C. 12 protões, 12 electrões e carga +2 D. 12 protões, 12 electrões e 10 neutrões E. 12 protões, 10 electrões e 12 neutrões																							
13.	O elemento cujo átomo tem maior nº de electrões em sua camada externa é aquele cujo número atómico é: A. 2 B. 7 C. 12 D. 11 E. 4																							
14.	Indique a alternativa correcta para completar as lacunas da frase seguinte: "Um elemento químico é representado pelo seu _____, é identificado pelo número de _____ e pode apresentar diferente número de _____." A. Nome-protões-camadas B. Nome-electrões-protões C. Símbolo-protões-neutrões D. Símbolo-neutrões-protões E. Símbolo-electrões-neutrões																							
15.	Os elementos carbono ($Z = 6$) e oxigénio ($Z = 8$) combinam-se para formar dióxido de carbono. Este composto apresenta: A. 2 ligações covalentes comuns e 2 ligações dativas B. 1 ligação covalente comum e 3 ligações dativas C. 3 ligações covalentes comuns e 1 ligação dativa D. 4 ligações covalentes comuns E. 2 ligações covalentes comuns																							
16.	São dados dois compostos Z e Y , sendo o primeiro molecular, e o segundo iónico. Podemos afirmar categoricamente que: A. Z não conduz a corrente eléctrica quando fundido ou em solução aquosa B. Os dois quando fundidos, sempre conduzem a corrente eléctrica C. Somente Y pode conduzir a corrente eléctrica quando ambos estão em solução aquosa D. Somente Z pode conduzir a corrente eléctrica quando ambos estão em solução aquosa E. Y conduz a corrente eléctrica quando fundido ou em solução aquosa																							
17.	O aumento da diferença de electronegatividade entre os elementos ocasiona a seguinte ordem no carácter das ligações: A. Covalente polar, covalente apolar, iônica B. Iônica, covalente polar, covalente apolar C. Covalente apolar, iônica, covalente polar D. Covalente apolar, covalente polar, iônica E. Iônica, covalente apolar, covalente polar																							
18.	Passe para a pergunta seguinte																							
19.	Ao tentar testar a miscibilidade (se se misturam ou não) de cinco substâncias (I, II, III, IV e V) em água, um estudante obteve as seguintes proporções (Volume substância: Volume água):	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">Substância</th> </tr> <tr> <th>Solvente</th> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Água</td> <td>Miscível (1:50)</td> <td>Miscível (1:20)</td> <td>Imiscível</td> <td>Miscível (1:5)</td> <td>Miscível (1:100)</td> </tr> </tbody> </table>					Substância						Solvente	I	II	III	IV	V	Água	Miscível (1:50)	Miscível (1:20)	Imiscível	Miscível (1:5)	Miscível (1:100)
Substância																								
Solvente	I	II	III	IV	V																			
Água	Miscível (1:50)	Miscível (1:20)	Imiscível	Miscível (1:5)	Miscível (1:100)																			
	Com estes resultados, pode se dispor as substâncias na seguinte ordem crescente de polaridade: A. V, IV, III, II, I B. V, III, II, I, IV C. V, I, II, IV, III D. I, II, III, IV, V E. III, V, I, II, IV																							
20.	Em quais dos compostos a seguir apresentados existe a ligação iônica I. BF_3 II. LiF III. CF_4 IV. HF A. II e III B. II C. I e II D. III E. I e III																							
21.	Quais os compostos que podem reagir com o ácido sulfúrico? 1) CO_2 2) Na_2O 3) Al_2O_3 4) HCN A. 1 e 2 B. 2 e 3 C. 1 e 3 D. 1 e 4 E. 3 e 4																							
22.	Dados os compostos $Na_2(MnO_4)$, $Ca_3(CoF_6)_2$, $Na_2(B_4O_7)_2$ e $Mg_2(BO_3)_2$, as cargas dos iões entre parêntesis são respectivamente: A. $3^-, 3^-, 2^-, 2^-$ B. $2^-, 3^-, 2^-, 3^-$ C. $2^-, 2^-, 3^-$ e 3^- D. $3^-, 2^-, 3^-$ e 2^- E. $1^-, 3^-$ e 3^-																							
23.	As fórmulas do dicromato de potássio e hidrogenossulfito de sódio são, respectivamente: A. $K_2Cr_2O_6$ e $NaHSO_3$ B. $K_2Cr_2O_7$ e Na_2S C. K_2CrO_4 e $NaHSO_3$ D. $K_2Cr_2O_7$ e $NaHSO_3$ E. $K_2Cr_2O_7$ e $NaHSO_4$																							
24.	Qual destes compostos é um óxido básico? A. SO_3 B. MgO C. KOH D. CO_2 E. Cl_2O																							
25.	Atomos neutros de um certo elemento representativo M apresentam dois electrões em sua camada de valência. As fórmulas correctas para seu óxido normal e brometo são, respectivamente: (Dados: O = grupo 6A e Br = grupo 7A). A. M_2O e MBr B. MO_2 e MBr_2 C. MO e MBr_2 D. M_2O_2 e M_2Br E. M_2O e MBr_2																							
26.	Para preparar 1.2 litros de solução 0.4M de HCl , a partir do ácido concentrado (16M), o volume de água, em litros, a ser utilizado será de: A. 0,03 B. 0,47 C. 0,74 D. 1,03 E. 1,17																							
27.	Uma solução de concentração 0,5 normal apresenta, em cada litro: A. 0,5 mol de soluto B. 0,5 equivalente-grama de soluto C. 0,5 iões-grama de soluto D. 0,5 átomo-grama de soluto E. 0,5 molécula-grama de soluto																							
28.	Uma solução contém 30 g de iodeto de sódio, 48 g de hidróxido de sódio e 702 g de água. As fracções molares do iodeto e do hidróxido de sódio na solução são, respectivamente: (Dados: $M_I = 127$ uma e $M_{Na} = 23$ uma) A. 5 e 5 B. 0,05 e 0,3 C. 0,005 e 0,3 D. 0,5 e 0,3 E. 0,005 e 0,03																							
29.	A solubilidade da soda cáustica ($NaOH$) em água, em função da temperatura, é dada na tabela abaixo:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Temperatura (°C)</th> <th>20</th> <th>30</th> <th>40</th> <th>50</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Solubilidade (gramas/100 g de H_2O)</td> <td>109</td> <td>119</td> <td>129</td> <td>145</td> </tr> </tbody> </table>					Temperatura (°C)	20	30	40	50	Solubilidade (gramas/100 g de H_2O)	109	119	129	145								
Temperatura (°C)	20	30	40	50																				
Solubilidade (gramas/100 g de H_2O)	109	119	129	145																				
	Considerando soluções de $NaOH$ em 100 g de água, é correcto afirmar que a:																							

	A. 20 °C, uma solução com 120 g de NaOH é insaturada C. 30 °C, uma solução com 11,9 g de NaOH é concentrada E. 40 °C, uma solução com 129 g de NaOH é saturada	B. 50 °C, uma solução com 90 g de NaOH é saturada D. 30 °C, uma solução com 119 g de NaOH é supersaturada								
30.	O volume de água que se deve adicionar a 50 ml de uma solução de $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 0,4 N, a fim de torná-la 0,12 N, é igual a: A. 166,6 ml. B. 16,66 ml. C. 116,6 ml. D. 16,6 ml. E. 1,66 ml.									
31.	20 mL de uma solução 0,5 N de NaOH foram misturados com 30 mL de uma solução de H_2SO_4 0,2 N, contendo 2 gotas de fenolftaleína. Qual das afirmações seguintes é verdadeira, a mistura contém: A. excesso de NaOH e apresenta-se incolor C. excesso de H_2SO_4 e apresenta-se incolor E. pH igual a 7 e apresenta-se rósea	B. excesso de NaOH e apresenta-se rosa D. excesso de H_2SO_4 e apresenta-se rósea								
32.	Observe o gráfico a seguir e indique a afirmação correcta: A. A reacção é exotérmica C. A entalpia da reacção é de 22 Kcal E. A entalpia da reacção é de -22 Kcal	B. A entalpia dos reagentes é de 32 Kcal D. A energia de activação é de 22 Kcal								
33.	Os termos correctos para completar o texto seguinte são indicados na alínea: Substâncias simples são constituídas por um único _____ e no seu estado padrão _____ possuem entalpia igual a _____. O calor de _____ de 1mol de $\text{H}_2(\text{g})$ é numericamente igual ao calor de _____ de $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$. A. Elemento; 25°C e 1 atm; zero. Combustão; formação C. Elemento; 25°C e 1 atm; zero. Formação; combustão E. Elemento; 25°C e 1 atm; um. Combustão; formação	B. Átomo; 25°C e 1 atm; zero. Combustão; formação D. Átomo; 25°C e 1 atm; um. Formação; combustão								
34.	Dada a reacção de dimerização $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightarrow \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$, determine o valor de ΔH , sabendo que: Entalpia de formação de $\text{NO}_2(\text{g}) = +34 \text{ kJ/mol}$ Entalpia de formação de $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) = +10 \text{ kJ/mol}$	A. $\Delta H = -58 \text{ kJ}$ B. $\Delta H = +58 \text{ kJ}$ C. $\Delta H = +44 \text{ kJ}$ D. $\Delta H = -44 \text{ kJ}$ E. $\Delta H = -24 \text{ kJ}$								
35.	Em relação ao calor numa reacção química que ocorre com absorção de calor, a(s) afirmação correcta(s) é(são): I. H_f deve ser maior que H_i ; II. H_i deve ser maior que H_f ; III. H_i deve ser igual a H_f ; IV. A reacção é exotérmica	A. I e IV B. II C. III D. IV E. I								
36.	Dada a seguinte reacção: $2\text{NO}_{(g)} + \text{Cl}_{2(g)} \rightarrow 2\text{NOCl}_{(g)}$ Se a concentração de $\text{NO}_{(g)}$ aumentar duas vezes o que acontece com a velocidade da reacção? A. Aumenta duas vezes B. Aumenta quatro vezes C. Aumenta uma vez D. Diminui duas vezes E. Mantém-se constante									
37.	Na cinética de uma reacção, o aumento da temperatura provoca o aumento de todas as seguintes grandezas, excepto: A. Velocidade da reacção B. Energia do sistema C. Velocidade média das moléculas D. Energia de activação E. Energia cinética das partículas									
38.	A tabela a seguir mostra a relação entre a concentração de Y e a velocidade de reacção no processo de decomposição de Y:									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Velocidade (mol/L.min)</th> <th>V_1</th> <th>1.2×10^{-3}</th> <th>4.8×10^{-3}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[Y] (M)</td> <td>0.010</td> <td>0.100</td> <td>0.200</td> </tr> </tbody> </table>	Velocidade (mol/L.min)	V_1	1.2×10^{-3}	4.8×10^{-3}	[Y] (M)	0.010	0.100	0.200	
Velocidade (mol/L.min)	V_1	1.2×10^{-3}	4.8×10^{-3}							
[Y] (M)	0.010	0.100	0.200							
	Calcule o valor de V_1 :									
	A. 1.2×10^{-1} B. 2.4×10^{-5} C. 1.2×10^{-4} D. 1.2×10^{-2} E. 1.2×10^{-5}									
39.	Com base em estudos cinéticos, quais das afirmações abaixo estão correctas: I. Toda reacção é produzida por colisões, mas nem toda colisão gera uma reacção. II. Uma colisão altamente energética pode produzir uma reacção. III. Toda colisão com orientação adequada produz uma reacção. IV. A energia mínima para uma colisão efectiva é denominada energia da reacção. V. A diferença energética entre produtos e reagentes é denominada energia de activação da reacção	A. I, III e V B. I e II C. I, II e III D. I, II e IV E. I, IV e V								
40.	Dos factores abaixo mencionados, quais os que aumentam a velocidade de uma reacção química: A. Calor, catalisador, ausência de luz B. Calor, maior superfície de contacto entre reagentes, inibidor C. Calor, ausência de luz, inibidor D. Calor, maior superfície de contacto entre reagentes, catalisador E. Catalisador, frio, maior superfície de contacto entre reagentes									
41.	Em solução aquosa, iões cromato $(\text{CrO}_4)^{2-}$, de cor amarela, coexistem em equilíbrio com iões dicromato $(\text{Cr}_2\text{O}_7)^{2-}$, de cor alaranjada, segundo a reacção: $2(\text{CrO}_4)^{2-}(\text{aq}) + 2\text{H}^+(\text{aq}) \rightleftharpoons (\text{Cr}_2\text{O}_7)^{2-}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ A coloração alaranjada torna-se mais intensa quando se: A. Adiciona OH^- B. Aumenta a pressão C. Acrescenta mais água D. Acrescenta um catalisador E. Diminui o pH									
42.	A 500°C, o K_c para a reacção $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ é 0,061. Se as análises mostraram que a composição é 5,0M de N_2 , 1,0M de H_2 e 0,5M de NH_3 , pode-se afirmar que: I. A concentração de H_2 varia 3 vezes mais que a de NH_3 ; II. O NH_3 tenderá a se decompor à medida que a reacção tende para o equilíbrio; III. A reacção ainda não alcançou o equilíbrio; IV. O nitrogénio e o hidrogénio vão se formando com a reacção se processando até o equilíbrio; V. O NH_3 tenderá a se formar à medida que a reacção tende para o equilíbrio. As alternativas correctas são: A. III e V B. Apenas III C. Apenas I D. I, III e V E. I, II e IV									

43.	A constante de um sistema em equilíbrio é $K_c = [C]^2[D]^3/[A][B]^4$. A equação que representa a reacção desse sistema é: A. $2C + 3D \rightleftharpoons A + 4B$ B. $A + B^4 \rightleftharpoons C^2 + D^3$ C. $4AB \rightleftharpoons 2C + 3D$ D. $A + 4B \rightleftharpoons 2C + 3D$ E. $A + B_4 \rightleftharpoons C_2 + D_3$																
44.	Dadas as constantes de dissociação dos ácidos em água, indique o ácido mais forte: <table border="1"><tr><td>Ácidos</td><td>H_2S</td><td>HNO_2</td><td>H_2CO_3</td><td>C_6H_5COOH</td><td>CH_3COOH</td></tr><tr><td>K_a (a 25°C)</td><td>$1,0 \times 10^{-7}$</td><td>$6,0 \times 10^{-6}$</td><td>$4,4 \times 10^{-7}$</td><td>$6,6 \times 10^{-5}$</td><td>$1,8 \times 10^{-5}$</td></tr></table>					Ácidos	H_2S	HNO_2	H_2CO_3	C_6H_5COOH	CH_3COOH	K_a (a 25°C)	$1,0 \times 10^{-7}$	$6,0 \times 10^{-6}$	$4,4 \times 10^{-7}$	$6,6 \times 10^{-5}$	$1,8 \times 10^{-5}$
Ácidos	H_2S	HNO_2	H_2CO_3	C_6H_5COOH	CH_3COOH												
K_a (a 25°C)	$1,0 \times 10^{-7}$	$6,0 \times 10^{-6}$	$4,4 \times 10^{-7}$	$6,6 \times 10^{-5}$	$1,8 \times 10^{-5}$												
	A. H_2S	B. HNO_2	C. H_2CO_3	D. CH_3COOH	E. C_6H_5COOH												
45.	O ácido acético é um importante ácido orgânico. Em solução aquosa, constitui o tempero conhecido pelo nome de vinagre. De cada 1000 moléculas de ácido acético dissolvidas em água, apenas 13 sofrem ionização. Calcule o grau de ionização desse ácido e classifique-o quanto à sua força A. $\alpha = 13\%$, ácido forte B. $\alpha = 1,3\%$, ácido forte C. $\alpha = 0,76\%$, ácido fraco D. $\alpha = 1,3\%$, ácido fraco E. $\alpha = 13\%$, ácido fraco																
46.	Mistura-se 200mL de uma solução de HIO_3 a $4 \times 10^{-3}M$ com igual volume da solução de $Ba(OH)_2$ a 0.003M. Sabendo que o K_{ps} de $Ba(IO_3)_2$ é 1.57×10^{-9} , preveja a formação de precipitado de $Ba(IO_3)_2$: A. $PI > K_{ps}$ e há precipitação de $Ba(IO_3)_2$ B. $PI \approx K_{ps}$ e não há precipitação de $Ba(IO_3)_2$ C. $PI < K_{ps}$ e não há formação de precipitado de $Ba(IO_3)_2$ D. $PI < K_{ps}$ e há formação de precipitado de $Ba(IO_3)_2$ E. $PI > K_{ps}$ e não há formação de precipitado de $Ba(IO_3)_2$																
47.	Mergulhando uma placa de cobre dentro de uma solução de nitrato de prata, observa-se a formação de uma coloração azulada na solução, característica da presença de $Cu^{2+}(aq)$, e de um depósito de prata. Sobre essa reacção, pode-se afirmar correctamente que: A. A concentração dos iões nitrato diminui no processo B. O ião prata cede electrões à placa de cobre C. O ião prata é o agente redutor D. O cobre metálico é oxidado pelos iões prata E. Um ião prata é reduzido para cada átomo de cobre arrancado da placa																
48.	Na reacção representada pela equação: $MnO_4^- + xFe^{2+} + yH^+ \rightarrow Mn^{2+} + zFe^{3+} + wH_2O$. Os coeficientes x , y , z e w , são respectivamente: A. 5, 6, 5 e 3 B. 5, 4, 5 e 2 C. 3, 8, 3 e 4 D. 3, 8, 3 e 8 E. 5, 8, 5 e 4																
49.	Na obtenção industrial do alumínio, ocorre a seguinte reacção catódica: $Al^{3+} + 3e^- \rightarrow Al$. Sabendo que 1 F (faraday) é a carga de 1 mol de electrões, quantos faradays provocam a deposição de 9 quilogramas de alumínio? (Massa Atómica = 27 uma) A. 3 B. 30 C. 100 D. 300 E. 1000																
50.	Pertence à classe das aminas primárias o composto que se obtém pela substituição: A. De um dos átomos de hidrogénio do NH_3 por um radical acila B. De dois átomos de hidrogénio do NH_3 por dois radicais arila C. De um dos átomos de hidrogénio do NH_3 por um radical alquila D. De dois átomos de hidrogénio do NH_3 por um radical alquilidena E. De três átomos de hidrogénio do NH_3 por um radical alquilidina																
51.	A substância de fórmula C_8H_{16} representa um: A. Alcano de cadeia aberta B. Alcino de cadeia fechada C. Alceno de cadeia aberta D. Composto aromático																
52.	Em relação ao metilpropeno podemos afirmar que contém: A. Duas ligações pi B. Um carbono secundário C. Quatro carbonos e 10 hidrogénios D. Um carbono quaternário																
53.	O ácido propanóico reage com $NaOH$ para dar origem ao composto: A. CH_3CH_2CONa B. $CH_3-CH_2-CH_2-ONa$ C. $CH_2=CHONa-CH_3$ D. $CH_3CH_2COOH+Na$ E. $CH_3-CH_2-COONa$																
54.	Quando um dos hidrogênios da amônia é substituído por um radical arilo, o composto resultante é: A. Sal de amónio B. Imida C. Amina D. Nitrila E. Amida																
55.	A alternativa que apresenta isómeros funcionais de etoxi-etano e acetona, respectivamente, é: A. Todas as alternativas estão correctas B. Butanol-1 e propanol-1 C. Butanal e propanal D. Butanal e propanal																
56.	A reacção de propeno com brometo de hidrogénio obedece a: A. Regra de Markovnikov B. Teoria de Arrhenius C. Princípio de Pauli D. Regra de Ostwald E. Nenhuma das regras mencionadas																
57.	Pela sulfonação do benzeno obtém-se: A. Sulfato de fenila B. Sulfato de benzila C. Hidrogenossulfato de fenila D. Ácido benzenossulfônico E. Hidrogenossulfato de benzila																
58.	A reacção de 1 bromo propano com sódio metálico produz: A. Propano B. Hexano C. Pentano D. 2,2 dimetilbutano E. 2,3 dimetil butano																
59.	O mecanismo da reacção entre o tolueno e o ácido nítrico obedece a: A. Adição eletrofílica B. Substituição radicalar C. Adição nucleofílica D. Eliminação																

FIM!

BIBLIOTECA EDUSKILLS

Encontre Aqui:

- Livros Escolares - (1^a a 12^a Classe);
- Exames Escolares - (1^a a 12^a Classe)
- Exames de Admissão (Todas Universidades)
- Exames Resolvidos
- Trabalhos feitos.

Acesse mais Conteúdos agora

www.eduskills.co.mz

ou

CLIQUE AQUI

Qual livro ou exame procuras? ☎ 861003535

